

令和7年度 こどもの予防接種

対象疾病	回数	接種対象者	予診票送付時期(通知時期)	標準的な接種期間	接種間隔	実施場所		
B型肝炎	初回(2回)	1歳に至るまで	生後2か月	2か月から9か月に至るまで	27日以上	指定医療機関		
	追加(1回)				1回目の接種から139日以上			
ロタウイルス感染症	ロタリックス(2回)	生後6週0日後から24週0日後まで		初回:2か月から出生14週6日後まで	27日以上の間隔をあけて2回		27日以上の間隔をあけて3回	
	ロタテック(3回)	生後6週0日後から32週0日後まで						
小児の肺炎球菌感染症	標準4回	生後2か月から5歳に至るまで		初回:2か月から7か月に至るまで	標準4回		※接種開始時期により異なります。裏面もご覧ください。	
5種混合 (ジフテリア 破傷風 百日せき 不活化ポリオ Hib感染症)	初回(3回)	生後2か月から7歳6か月に至るまで		初回:2ヶ月から7か月に至るまで開始、 20日から56日までの間隔をあける	20日以上の間隔をあけて3回		初回接種から6か月以上あけて1回	
	追加(1回)			追加:初回接種終了後から6か月から 18か月までの間隔をあける				
BCG	1回	1歳に至るまで		5か月から8か月に達するまで	1回		健康センター (月2回)	
麻しん風しん混合	1期(1回)	生後12か月から24か月に至るまで		満1歳の誕生日			1回	指定医療機関
	2期(1回)	小学校就学前の1年間		就学1年前の4月			1回	
水痘	初回(1回)	生後12か月から36か月に至るまで	満1歳の誕生日	12か月から15か月に達するまで	生後12か月以上に1回目			
	追加(1回)			1回目接種後6か月から12か月までの間隔をあける	初回接種から3か月以上あけて2回目			
日本脳炎	1期 初回(2回) 追加(1回)	生後6か月から7歳6か月に至るまで	満3歳の誕生日 ※平成19年4月1日以前に生まれた方で、 接種を希望の方には予診票を交付 (20歳未満まで)	1期初回:3歳から4歳に達するまで	6日以上(標準は6日から28日まで)の間隔をあけて2回目			
				1期追加:4歳から5歳に達するまで	初回終了から6か月以上(標準はおおむね1年経過後)に1回			
2期(1回)	9歳以上13歳未満	満9歳の誕生日 ※平成19年4月1日以前に生まれた方で、 接種を希望の方には予診票を交付 (20歳未満まで)	9歳から10歳に達するまで	1回				
ジフテリア・破傷風	2期(1回)	11歳以上13歳未満	小学6年生の4月	11歳から12歳に達するまで	1回			
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防ワクチン)	サーバリックス(2価)(3回)	小学6年生から高校1年生相当の年齢の女性	小学6年生の4月	中学1年生相当	1回目の接種から1か月の間隔をあけて2回目 1回目の接種から6か月の間隔をあけて3回目(計3回) ※ただし、上記間隔で接種できない場合、1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目から2か月半以上あけて3回目			
	ガーダシル(4価)(3回)				中学1年生相当	1回目の接種から2か月の間隔をあけて2回目 1回目の接種から6か月の間隔をあけて3回目(計3回) ※ただし、上記間隔で接種できない場合、1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目、2回目から3か月以上の間隔をあけて3回目		
	シルガード9(9価)(2回)	小学6年生から高校1年生相当の年齢の女性で1回目の接種が15歳に至るまでの場合		中学1年生相当 (1回目の接種が小学6年生から15歳に至るまで)	1回目の接種から6か月の間隔をあけて2回目(計2回) ※ただし、上記間隔で接種できない場合、1回目の接種から5か月以上の間隔をあけて2回目 ※1回目と2回目の接種間隔が5か月未満の場合は計3回			
	シルガード9(9価)(3回)	小学6年生から高校1年生相当の年齢の女性で1回目の接種が15歳以上の場合		中学1年生相当	1回目の接種から2か月の間隔をあけて2回目 1回目の接種から6か月の間隔をあけて3回目(計3回) ※ただし、上記間隔で接種できない場合、1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目、2回目から3か月以上の間隔をあけて3回目			